

Barrier

耐病性強化

リーフアップ バリア



NET 5ℓ

高濃度有機酸 で作物を **健康体**に!

有機酸で外からガード!

代謝促進に!

天候不順対策!

品質向上!



有機酸が
がちり
ガード!

※有機JAS規格栽培にはご使用いただけません

使用方法 (10aあたり)	野菜		水稻
	【育苗～定植後】 500～800倍液		【最高分けつ期前後】 200～300倍
	【生育中期～収穫期】 300～500倍液		【出穂前】 200～300倍
	※リーフアップN 又は リーフA液材 との混用時 500倍液		【出穂後】 200～300倍
	葉菜・根菜類	果菜類	【登熟期】 200～300倍
	100～200ℓ を 葉面散布	200～300ℓ を 葉面散布	連用が効果的!! 5～7日おき

使用タイミング

※アルカリ資材との混用は避けて下さい

- ◎ 降雨後や曇雨天のとき
- ◎ 蝶や蛾の飛来を見かけたとき
- ◎ 作物が軟弱生育のとき
- ◎ 葉面散布の補助材として
- ◎ 湿度が高いとき

天候不順などで作物の
体調が崩れそうなき、
小まめな散布で予防!!



 株式会社 **ミズホ**

〒466-0807 名古屋市昭和区山花町64-1
TEL:052(763)4171(代) FAX:052(761)3771
HP:<http://www.mizuho.to/> e-mail: bio@mizuho.to



〈お問い合わせ〉

Blank space for contact information.