

バクヤーゼK 15kg入

浮きワラが
田植えを
邪魔する

病原菌の
持ち越し

ガス害で
根痛み

撒いて!!
耕して!!
耕すだけ!!

分解

地力向上

ミネラル・
アミノ酸補給

残渣分解
堆肥化促進

信じる者は救われる!
土作りの救世主!

バクヤーゼKの使用方法 (10a)

収穫後、全面散布し耕起する。

普通地力田：3～4袋

低地力田：5～6袋

モミガラ還元田(10a分のモミガラ)
：上記プラス2～3袋

※耕起は数回(最低2回)行い、回数を
重ねるにつれて深く耕起する。



収穫後の次作段取りは大切!! 土が若返る!! ミネラルいっぱい!!

秋冬野菜に バクヤーゼKを

バクヤーゼ菌で畑の健康を取り戻す!!



- 畑作の残渣物も強力に分解
- 未熟な堆肥の土中再発酵を促進
- 土壌の団粒化を助ける
(物理性改善)
- 有効微生物が土壌のさまざまな
トラブルから根を守る
(微生物性と化学性の改善)
- アミノ酸、ミネラル豊富

土づくり&元肥の利用がお勧め!!

<成分分析値>

工場	N	P	K	Mg
岩手	3.5	4.5	3.0	1.0
愛知	3.1	5.0	3.0	1.5
香川	3.0	6.0	4.0	1.5

※生産工場によって成分が異なります。

NET 15kg (粒状・ペレット状)

対応機種：ブロードキャスト
：ソワー (粒状)
：背負散布機 等

使用方法

- 露地畑の収穫後
10~20袋/10a
収穫終了後、堆肥とともに施用、その後耕起
- ハウスの収穫後
20~30袋/10a
収穫終了後、堆肥とともに施用、その後耕起
- 秋冬野菜の元肥
15~20袋/10a
(チッ素成分:7~10kg)
作付2週間前までに施用 (特に播種もの)。
不足チッ素分は、NK化成などを利用して下さい。