

リーフアップCa 使用方法一例(10a当たり)

品目	生育時期	使用目的・時期	希釈・使用回数
ナス科 果菜類	育苗時	本葉2～3枚頃から	1000倍液 3～5日おきに連用
	生育初期	定植後	800倍液 5～7日おきに連用
	収穫頃～	尻腐れ対策	500倍液 5～7日おきに連用 生長点付近中心
果菜類 (スイカ・メロン等)	分化期	開花前～	500倍液 3～5日おきに連用
	収穫前	糖度促進～	500倍液 3～5日おきに連用
結球野菜	育苗時	本葉2～3枚頃から	1000倍液 3～5日おきに連用
	生育初期	定植直後 (芯腐れ対策)	800倍液 5～7日おきに連用
花卉	育苗時	本葉1～2枚頃	1000倍液 3～5日おきに連用
	生育全期	葉先枯れ対策	800～1000倍液 3～5日おきに連用
果樹	開花期	萌芽はじめ	500～800倍液 3～5日おきに連用
	果実肥大期	細胞分裂促進補助	結実確認後 500～1000倍液 2～3日おきに2～3回連用
	収穫前	糖度着色向上	着色はじめ頃から 500倍液 2～5日おきに連用
	収穫後	苦土欠対策	500倍液 5～7日おきに連用

リーフアップCa使用上の注意

- 葉面や果面に障害が生じやすい作物は、
予め小面積でテストを行ってから使用して下さい
- 「石灰硫黄剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、
危険ですから混用は行わないで下さい